



Samarrinho

Vass7R03s361-365



INRA


Collection Vassal-Montpellier

OMtp1021

*+ R3 s 361-365
Samarrinho blanc*

Samarrinho bl

7 R 3 s 361. 365







ANNEE 1989

NOM samarinho (bl)
292701
p.e.

EMPLACEMENT 7 R 3 361 365

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	23.3	27.3 *	5								
2	2	23.3	27.3 *	2								
3	4	13.3	23.3 *	9	15	25.5	30.5	5.6	24.7	3.8	8.8	4.9
4	5	13.3	16.3 *	6								
5	4	13.3	20.3 *	8								
	13			30								

Pourriture : 0

Mill. :

50%

Port : mi' enge'

Vigueur : 3

De 23.3.89 +5

ANNEE 1990

NOM samarinho bl p.e.
mi

EMPLACEMENT

7 R 3 361.365 ..

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	26.2	12.3 *	14								
2	3	1.3	5.3 *	2								
3	4	26.2	5.3 *	13	17	17.5	23.5	25.5	23.7	30.7	6.8	3.9.90
4	4	26.2	5.3 *	3								
5	4	26.2	1.3 *	4								
	21	De	5.3.90	(-4)								

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : 1/2 enge'

Vigueur : 3.5

ANNEE 1991

NOM Samavinho p.e EMPLACEMENT 7 R3 1361.365
2927 faux

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	9	15.3	26.3 *	10	19	1.6	4.6	7.6	6.4	13.8	19.8	9.9
2	3	15.3	21.3 *	7			+4			+3		+4
3	6	15.3	26.3 *	10								
4	4	15.3	18.3 *	6								
5	8	15.3	18.3 *	14								

Grappe : G - (M) - P Dim : 12 Compacité : L - M - C
Pour : 1 Mill : 0
Baie : TG - G - (M) - P Dim : 16x14
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : 1/2 Vigueur : 4

D & 21.3.91
+3

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Samarinho branco
7 R 3 A. 361-365 (4)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.
Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 191 - sans villosité
laineuse 192.
Blanc 193 - fauve ou roux 194 - carminé 195 - à liséré carminé 196 -
jaune 197 - à plages bronzées ou cuivrées 198 - entièrement bronzé
ou cuivré 199 - vert 200.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.
Face inférieure : glabres 201 - sétueuses 202 - veloutées 203 -
aranéuses 204 - duveteuses 205 - cotonneuses 206 - sans villosité
pubescente 207 - sans villosité laineuse 208.
Face supérieure : blanches 209 - fauves ou rousses 210 - carminées 211 -
à liséré carminé 212 - jaune 213 - à plages bronzées ou cuivrées 214 -
entièrement bronzées ou cuivrées 215 - vertes 216 - autres 217.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 218 - sétueux 219 - velouté 220 - aranéeux 221 -
duveteux 222 - cotonneux 223 - sans villosité pubescente 224 -
sans villosité laineuse 225.

Limbe : glabre 226 - sétueux 227 - velouté 228 - aranéeux 229 -
duveteux 230 - cotonneux 231 - sans villosité pubescente 232 -
sans villosité laineuse 233.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 234 - fauve ou roux 235 - carminé 236 - à liséré carminé 237 -
jaune 238 - à plages bronzées ou cuivrées 239 - entièrement bronzées ou
cuivrées 240 - verte 241.

A pétiole glabre 242 - sétueux 243 - velouté 244 - aranéeux 245 -
duveteux 246 - cotonneux 247 - sans villosité pubescente 248 - sans
villosité laineuse 249.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 88

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Samarrinho branco

7R30-361-365(0-5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
sêteux 245 - velouté 246 - aranêux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.
subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 88

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Samarinho branco

7 R30-361-365 (1.5)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 ^{sete} duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 ^{pink} - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 -
partiellement - totalement.

Calvo88

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Samarinho blanc
7 R3, 361-365 (p.5)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 12 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions 17 x 16).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 88

Samarinho branco

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

7 R3 s - 364-365 s.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne :7..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 88

N° d'ordre : ~~2927~~.01
Désignation : *Samarinho blanc*
Emplacement : *7 R 3 1361. 365 -*

Angle des nervures : 1 - 2 - (3)
Sexe : 4 - 5 - (6)
L₁/L₂ : (7) - (8) - 9
L₂/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - (18) - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - (28) - (29)
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - (34) - 35 - 36 - 37 - (38) - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - (61) - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remmes 90